

Obrigada por ver esta apresentação

Gostaríamos de recordar-lhe que esta apresentação é propriedade do autor.

É-lhe fornecida pela Sociedade Portuguesa de Pediatria no contexto do 16º Congresso Nacional de Pediatria, para seu uso pessoal, tal como submetido pelo autor

© 2015 pelo autor

Diagnóstico e tratamento da amigdalite aguda pediátrica – Há vantagem em dez dias de tratamento?

Catarina Oliveira Pereira, Daniela Ramos, Patrícia Mação, Gustavo Januário, Luís Januário
Serviço de Urgência e Unidade de Infecciologia, Hospital Pediátrico - CHUC

Introdução e objetivos

- Na AA bacteriana a duração do tratamento antibiótico preconizado é de 10 dias (NOC-DGS 2012)
- Parece haver igual eficácia com a utilização de esquemas curtos

Pediatr Infect Dis J. 1996

Six-day amoxicillin vs. ten-day penicillin V therapy for group A streptococcal tonsillopharyngitis.

The Cochrane Library. 2012

Short-term late-generation antibiotics versus longer term penicillin for acute streptococcal pharyngitis in children (Review)


- **Objetivo:** Caracterizar a orientação dos diagnósticos de AAE e escarlatina no SU-HP, nomeadamente os esquemas terapêuticos utilizados

Métodos


- Análise retrospectiva
- Jan a Dez 2014 (12 meses)
- SU-HP (nível A1, 60 mil urgências/ano)
- Critérios de inclusão:
 - Idade < 18A
 - Diagnóstico de AA
 - AAE e escarlatina – tratamento AB
- Variáveis analisadas: género, idade, realização e resultado do TDAR, tratamento, complicações, readmissão nos 30 dias seguintes
- Análise comparativa (SPSS®v21) de esquemas terapêuticos com amoxicilina:
 - curtos (até 7 dias)
 - longos (10 dias)

Resultados

- 2638 AA → 1190 (45,1%) etiologia bacteriana




- Género feminino = 50,2%
- Idade Mediana = 5,6A (AIQ 3,9-8,8)



Resultados

- 1190 AAE + Escarlatina → TDAR 830 (69,7%) → TDAR positivo 804 (96,9%)



Resultados


O antibiótico mais usado foi a **amoxicilina** → 93,1% (n=1108)

Duração do tratamento:

- Mediana **7 dias**
- AIQ 7-10
- 10 dias → 30% casos

Esquemas terapêuticos de amoxicilina			
Duração	Até 7 dias	10 dias	
% (n)	54% (598)	30% (331)	
Idade [anos (AIQ)]	5,6 (3,7-8,3)	5,2 (3,8-7,9)	p=0,487
Género masculino [% (n)]	51% (307)	49% (162)	p=0,484

Resultados



Conclusão

- Na amostra analisada **NÃO se verificaram diferenças significativas** em relação à readmissão no SU os 30 dias seguintes e ao desenvolvimento de complicações, **entre os grupos que utilizaram esquemas curtos e longos de amoxicilina**
- **Não parece haver benefício na utilização de esquemas longos**